



Пусть сухие глаза
скажут

Miebo[®]

(перфторгексилотан,
глазные капли)

ohh yeah

**Единственные
рецептурные**

глазные капли, которые
помогают бороться
непосредственно с
испарением слезной
жидкости

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат МІЕВО[®] (перфторгексилотан, глазные капли) применяется для лечения признаков и симптомов «сухого глаза».

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед применением МІЕВО снимите контактные линзы и подождите не менее 30 минут, прежде чем надеть их снова

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Мизбо.

Содержание

- 4** Подробнее о MIEBO
- 6** Типы синдрома «сухого глаза»
- 8** Симптомы «сухого глаза»
- 10** Об испарении слезной жидкости
- 14** Поиск подходящего лечения
- 16** Как работает MIEBO
- 20** Результаты применения MIEBO
- 22** Как применять MIEBO
- 24** Ощущения при применении MIEBO
- 26** Экономия и поддержка

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Очень важно применять MIEBO строго по указаниям врача
- Безопасность и эффективность MIEBO у детей младше 18 лет пока не изучена

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Миэбо.

Miebo
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Для глаз, которые говорят



**Единственные рецептурные
глазные капли, которые
помогают бороться
непосредственно с
испарением слезной
жидкости.**

Возможно, вы никогда не слышали о такой проблеме, как испарение слезной жидкости, однако это **причина № 1** появления беспокоящих симптомов «сухого глаза».

До появления МІЕВО не существовало рецептурных глазных капель, которые помогали бы напрямую бороться с повышенным испарением слезной жидкости.



ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Наиболее частым побочным эффектом, отмечавшимся в исследованиях, было помутнение зрения (1–3 % пациентов сообщали о помутнении зрения и покраснении глаз)

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Мизбо.

Miebo
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Почему возникает сухость глаз?

Каковы причины появления симптомов «сухого глаза»?

Есть ли у вас **ощущение песка, инородного тела в глазах** или **чувство усталости глаз** независимо от того, чем вы занимаетесь? Меняется ли ваше зрение в течение дня?

Существует 2 типа синдрома «сухого глаза»:



Возникающий из-за повышенного испарения слезной жидкости, что встречается примерно у **9 из 10** человек с этим синдромом



Возникающий из-за недостаточной выработки слезной жидкости, этот тип синдрома «сухого глаза» встречается гораздо реже

Иногда встречается **смешанный тип синдрома «сухого глаза».**

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Перед применением MIEBO снимите контактные линзы и подождите не менее 30 минут, прежде чем надеть их снова

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите [здесь](#), чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Миэбо.

Miebo
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Каковы ощущения при сухости глаз?

При **повышенном испарении слезной жидкости** часто наблюдается следующее:



Необходимость «проморгаться», чтобы зрение стало более четким



Колебания остроты зрения



Усугубление симптомов в течение дня

Почему при сухости глаза слезятся?

Закапывать глазные капли в слезящиеся глаза может показаться странным. Но слезоточивость — это распространенный симптом «сухого глаза». Она может быть признаком того, что слезная жидкость испаряется слишком быстро.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Очень важно применять МИБЕВО строго по указаниям врача
- Безопасность и эффективность МИБЕВО у детей младше 18 лет пока не изучена

При сухости глаз, вызванной повышенным испарением слезной жидкости, у вас могут быть следующие ощущения в глазах:

Ощущение песка



Тяжесть




Саднящие ощущения



Раздражение



Ощущение инородного тела



Светобоязнь



Боль



Покалывание



Зуд



Жжение



Чувство усталости



Слезоточивость



Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Миэбо.


Miebo
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Слезы испаряются слишком быстро? Только не это!

У всех людей слезная жидкость испаряется. Но если у вас **синдром «сухого глаза» вызван повышенным испарением слезной жидкости**, то это означает, что она испаряется слишком быстро — быстрее, чем в случае того, что считается нормой. При этом возникает ощущение **сухости, инородного тела и песка в глазах**.

Почему слезная жидкость испаряется слишком быстро

На поверхности глаза находится так называемая «**слезная пленка**». Она состоит из 3 слоев:



В здоровых глазах жировой слой предотвращает высыхание слезной жидкости.

При синдроме «сухого глаза», вызванном повышенным испарением слезной жидкости, **жировой слой не выполняет свою функцию**, из-за чего слезная жидкость испаряется слишком быстро.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Наиболее частым побочным эффектом, отмечавшимся в исследованиях, было помутнение зрения (1–3 % пациентов сообщали о помутнении зрения и покраснении глаз)

Рассмотрим подробнее

Небольшие железы, называемые **мейбомиевыми железами**, вырабатывают секрет, образующий на поверхности глаза жировой (липидный) слой, препятствующий испарению находящейся под ним слезной жидкости.

При **синдроме «сухого глаза», вызванном повышенным испарением слезной жидкости**, мейбомиевы железы работают не так, как требуется и жировой слой **повреждается**.

Такое повреждение приводит к повышенному **испарению слезной жидкости**.



Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Миебо.

Miebo
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Причины повышенного испарения слезной жидкости

Факторы развития синдрома «сухого глаза», вызванного повышенным испарением слезной жидкости



Время нахождения перед экраном компьютера (редкое моргание)

Когда вы сконцентрированы на определенных видах деятельности, вы моргаете реже, даже не замечая этого. Исследование показало, что, глядя на экран, человек может моргать всего лишь 7 раз в минуту, а во время чтения книги — только 10–15 раз в минуту. Когда вы не моргаете так часто, как требуется, слезная жидкость испаряется быстрее.



Некоторые лекарства

Применение антигистаминных, сосудосуживающих препаратов, препаратов для лечения угревой сыпи, антидепрессантов, сердечных препаратов и препаратов для лечения диабета может влиять на слезную пленку.



Условия окружающей среды

Ветер, дым, кондиционирование воздуха или сухой воздух могут ускорять испарение слезной жидкости.



Дисфункция мейбомиевых желез

Если мейбомиевы железы (железы, отвечающие за образование особого жирового слоя на поверхности глаза) закупориваются или работают не так, как требуется, слезная пленка не формируется надлежащим образом. Это основная причина повышенного испарения слезной жидкости.



Воспаление

Воспаление в сухом глазу — очень частое явление. Если из-за повышенного испарения слезной жидкости повреждается поверхность глаза, это тоже может стать причиной воспаления. В такой ситуации воспаление может усугубиться, что, в свою очередь, создает порочный круг ухудшения симптомов и признаков «сухого глаза».



Возрастные изменения

Сухость глаз может быть естественным следствием процесса старения.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Перед применением **MIEBO** снимите контактные линзы и подождите не менее 30 минут, прежде чем надеть их снова

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите [здесь](#), чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Миебо.

Miebo
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Поиск подходящего лечения

Подходит ли мне МІЕВО?

Если вы уже пробовали безрецептурные и рецептурные средства или какие-то процедуры, но облегчения так и не наступило, возможно, пора попробовать что-то другое. Попробуйте узнать у своего врача о препарате МІЕВО.

Другие глазные капли могут восполнять недостаток слезной жидкости или стимулировать ее выработку. Но почти у **9 из 10** человек причина сухости глаз заключается, помимо всего прочего, в повышенном **испарении слезной жидкости**. Это означает, что только применения других капель может быть недостаточно.

Miebo

— это **единственные рецептурные глазные капли, которые помогают напрямую бороться с повышенным испарением слезной жидкости**

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Очень важно применять МІЕВО строго по указаниям врача
- Безопасность и эффективность МІЕВО у детей младше 18 лет пока не изучена



Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Мизбо.

Miebo
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Как работает Miebo®

Попадая в глаз, капля МІЕВО **быстро и равномерно распределяется** по его поверхности и формирует защитный слой. Это уменьшает испарение, позволяя сохранить больше естественной слезной жидкости.

Защитный слой, сформированный МІЕВО:




Может способствовать
заживлению поверхности глаза
при длительном применении
препарата (в соответствии с
указаниями врача)



Может уменьшать
трение, которое
ощущается при
моргании

Хотите узнать подробнее о
том, как работает МІЕВО?

**Посмотрите
видео**



Драматизирование. Точный
механизм действия МІЕВО
неизвестен.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Наиболее частым побочным эффектом, отмечавшимся в исследованиях, было помутнение зрения (1–3 % пациентов сообщали о помутнении зрения и покраснении глаз)

Пожалуйста, ознакомьтесь
с важной информацией
по безопасности. Нажмите
здесь, чтобы ознакомиться
с полной информацией
о назначении препарата
Мизбо.

Miebo®
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Это другой вид капель?

Miebo
ohh yeah

Первые и единственные в своем роде

МІЕВО — это первые и единственные рецептурные глазные капли, которые помогают напрямую бороться с повышенным испарением слезной жидкости.

Защитный слой

Предотвращает испарение слезной жидкости точно так же, как и наружный защитный слой вашей естественной слезной пленки.

Длительный эффект

При продолжительном применении способствует формированию надежного барьера, который препятствует испарению слезной жидкости и ослабляет тем самым признаки и симптомы «сухого глаза».

Без консервантов

Это означает, что капли бережно воздействуют на глаза.

Только 1 ингредиент

Это означает, что капли не содержат других добавок или стероидов.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Перед применением МІЕВО снимите контактные линзы и подождите не менее 30 минут, прежде чем надеть их снова

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите [здесь](#), чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Мизбо.

Miebo
(перфторгексилотан,
глазные капли)

Как может помочь Mиебо®

В клинических исследованиях было показано, что применение MIEBO значительно* ослабляет:



Признаки «сухого глаза»

При продолжительном применении MIEBO врачи отмечают улучшение состояния поврежденной поверхности глаза.



Симптомы «сухого глаза»

Участники исследований сообщали о значительном уменьшении ощущения сухости глаз.

Облегчение всего через 2 недели

В исследованиях врачи проверяли наличие признаков и симптомов «сухого глаза» спустя 2 недели, а затем еще раз спустя 8 недель. У пациентов отмечалось значительное улучшение состояния как при первом, так и при втором осмотре на фоне непрерывного применения MIEBO.

*Действие MIEBO изучалось в сравнении с физиологическим раствором в 2 клинических исследованиях с участием более 1200 пациентов, которым закапывали один из растворов 4 раза в день.

Побочные эффекты при применении MIEBO отмечаются нечасто

MIEBO — это рецептурные глазные капли, одобренные FDA. Поскольку эти капли отпускаются по рецепту, их действие у пациентов тщательно изучалось, в отличие от безрецептурных капель типа «искусственная слеза».

Безопасность MIEBO изучалась в 2 клинических исследованиях (GOBI и MOJAVE) продолжительностью 57 дней с участием более 600 человек. **Ни в одном из исследований не отмечалось тяжелых побочных эффектов.** Ниже приведены усредненные данные по исследованиям.

0	0 тяжелых побочных эффектов. Ни у кого из применявших MIEBO не наблюдалось тяжелых побочных эффектов.
0,2%	0,2 % участников прекратили применение MIEBO из-за побочных эффектов. Из 614 человек, участвовавших в исследованиях, только 1 прекратил применение MIEBO из-за побочных эффектов. (В исследовании GOBI: 1 человек; в исследовании MOJAVE: 0 человек)
0,5%	У 0,5 % участников возникало ощущение жжения или покалывания. Лишь несколько человек сообщали о появлении ощущения жжения или покалывания при применении MIEBO. (В исследовании GOBI: 3 человека; в исследовании MOJAVE: 0 человек)
2,1%	2,1 % участников сообщили о помутнении зрения. Наиболее частым побочным эффектом MIEBO являлось помутнение зрения, которое отмечалось у 2,1 % человек. Обычно оно проходило в течение нескольких минут. Кроме того, у 0,8 % участников отмечалось покраснение глаз. (В исследовании GOBI: 9 человек; в исследовании MOJAVE: 4 человека)

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Очень важно применять MIEBO строго по указаниям врача
- Безопасность и эффективность MIEBO у детей младше 18 лет пока не изучена

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите [здесь](#), чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Миебо.

Miebo®
(перфторгексилотан,
глазные капли)

На старт, внимание, марш! Как применять

Miebo®

Следуйте этой простой инструкции:

1

На старт!

Если вы носите контактные линзы, то перед применением MIEBO снимите их, а после применения подождите не менее 30 минут, прежде чем надеть их снова.

2

Внимание!

Подготовка флакона к применению:

- Открутите колпачок
- Слегка сожмите флакон
- Переверните его вверх дном
- Прекратите сжимать

3

Марш!


Держа флакон вверх дном, расположите его над глазом. Затем аккуратно сожмите флакон, чтобы закапать 1 каплю.

Повторите все действия по подготовке флакона и закапайте 1 каплю в другой глаз.

4

Применяйте ежедневно (в соответствии с указаниями врача)

Для достижения наилучших результатов продолжайте применять MIEBO в соответствии с указаниями врача.



Нужна помощь?

Посмотрите, как это делается



ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Наиболее частым побочным эффектом, отмечавшимся в исследованиях, было помутнение зрения (1–3 % пациентов сообщали о помутнении зрения и покраснении глаз)

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Мизбо.

Miebo®

(перфторгексилотан,
глазные капли)

Опыт применения Miebo®



Большинство участников клинических исследований отмечали, что применять MIEBO было **комфортно или очень комфортно***.



MIEBO не содержит воды, поэтому капля этого раствора гораздо **меньше, чем в случае большинства** других глазных капель.



В состав капель входит всего 1 ингредиент, обладающий уникальными свойствами, так что **вы можете даже не почувствовать его** или у вас может даже не возникнуть желания поморгать.

***В ходе исследований 81 % участников, получавших MIEBO, оценил комфортность применения этих капель на 7 баллов или выше по шкале от 0 до 10.**

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Перед применением MIEBO снимите контактные линзы и подождите не менее 30 минут, прежде чем надеть их снова

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите [здесь](#), чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Мизбо.

Miebo®
(перфторгексилотан,
глазные капли)

2 способа сэкономить

Благодаря нашим службам поддержки доплата за выписанный препарат MIEBO для пациентов с частной страховкой, отвечающих необходимым требованиям, может составлять **0 долл. США*** в случае использования специальной карты доплат за MIEBO или аптечной службы BlinkRx.

Карта доплат за MIEBO

Приняв участие в программе MySavings, вы можете сэкономить на доплатах за MIEBO.

Для отвечающих необходимым требованиям пациентов с частной страховкой, которые оформили карту доплат за MIEBO, доплата может составлять **0 долл. США*** как при первом, так и при повторном получении препарата. Картой доплат за MIEBO можно пользоваться как в обычных аптеках, так и в интернет-аптеке BlinkRx.



Рецепт на
Miebo®

можно отправить в большинство обычных аптек, но существует и цифровая альтернатива — интернет-аптека BlinkRx. **Подробные сведения см. ниже.**

Miebo® RX in a blink

Patient support powered by BLINKRX

Что можно ожидать при использовании BlinkRx

Низкая цена на MIEBO

BlinkRx сотрудничает с вашей страховой компанией. Если у вас имеется частная страховка и вы отвечаете необходимым требованиям, то к вашему рецепту на MIEBO будут применяться доступные скидки*. В этом случае вам не нужна карта доплат†.

Простота использования

BlinkRx отправит вам текстовое сообщение с самой низкой ценой из всех возможных. Вы сможете оплатить покупку выписанного вам препарата MIEBO онлайн или по телефону.

Возникли вопросы о BlinkRx?

Позвоните по телефону **1-833-914-3856** или отправьте сообщение по электронной почте на адрес **support@blinkrx.com**.

Помощь с рецептами

В команде BlinkRx есть фармацевты, которые могут ответить на вопросы, помочь с повторным получением препарата и отправить напоминание.

Быстрая бесплатная доставка

BlinkRx доставит выписанный вам препарат MIEBO бесплатно. Для отвечающих необходимым требованиям пациентов с частной страховкой доплата может составить 0 долл. США*.

*В соответствии с условиями и положениями. Данное предложение действительно только для отвечающих необходимым требованиям пациентов с частной страховкой. Данное предложение не распространяется на лиц, отвечающих необходимым требованиям для возмещения расходов на рецептурные препараты, в полном объеме или частично, любыми федеральными, региональными или иными государственными программами, включая, помимо прочего, Medicare (в том числе планы Medicare Advantage, а также Часть A, Часть B и Часть D), Medicaid, TRICARE, медицинское страхование от Управления по делам ветеранов войны или Министерства обороны, CHAMPUS, государственную программу медицинского страхования Пуэрто-Рико или любые другие федеральные либо региональные программы медицинского страхования. Требования, которым необходимо соответствовать, а также все условия и положения представлены на веб-сайте MIEBO.CopaySavingsProgram.com. Дополнительные условия и положения см. на веб-сайте BlinkRx.com.

†Предложения, касающиеся доплат за MIEBO, также доступны тем, кто не пользуется услугами BlinkRx, за счет участия в программе MySavings.

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Миэбо.

Miebo®
(перфторгексилоктан,
глазные капли)

Для глаз, которые говорят

Miebo®

(перфторгексилоктан,
глазные капли)

ohh yeah

Узнайте у своего глазного врача

о единственных рецептурных глазных
каплях, которые помогают напрямую
бороться с повышенным **испарением**
слезной жидкости.



ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат МІЕВО® (перфторгексилоктан, глазные капли) применяется для лечения признаков и симптомов «сухого глаза».

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед применением МІЕВО снимите контактные линзы и подождите не менее 30 минут, прежде чем надеть их снова
- Очень важно применять МІЕВО строго по указаниям врача
- Безопасность и эффективность МІЕВО у детей младше 18 лет пока не изучена
- Наиболее частым побочным эффектом, отмечавшимся в исследованиях, было помутнение зрения (1–3 % пациентов сообщали о помутнении зрения и покраснении глаз)

Мы просим вас сообщать о нежелательных побочных эффектах рецептурных лекарственных препаратов в FDA. Посетите веб-сайт www.fda.gov/medwatch или позвоните по телефону **1-800-FDA-1088**.

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией по безопасности. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полной информацией о назначении препарата Миэбо.

BAUSCH + LOMB